



# PROSIsal L

## Desplazante Salino

La especial formulación de **PROSIsal L** a partir de Calcio acompañado por diferentes ácidos orgánicos ( ácidos polihidroxicarboxílicos) y carbohidratos, da como resultado un producto capaz de aportar el calcio necesario para desplazar al ion sodio del complejo del suelo, siendo este posteriormente lixiviado, además de mejorar las características físico-químicas del mismo, textura, retención de agua, absorción de otros elementos, etc.

### Aplicaciones

Dosis para suelo:

- Para suelos Salinos-Sódicos: 50 a 100 lts/ha. Aplicables durante todo el ciclo del cultivo
- Para suelos compactados: 45-50 lts/ha. Aplicables durante todo el ciclo del cultivo
- Problemas de Nascencia: 60-90 lts/ha. Aplicables durante todo el ciclo del cultivo

Dosis para aguas:

- Aplicar 45 cc/m<sup>3</sup> cuando el grado de salinidad sea de 1.5 gr/lit
- Aplicar 60 cc/m<sup>3</sup> cuando el grado de salinidad sea de 2.5 gr/lit

### Compatibilidad en Mezclas

Antes de preparar una mezcla final, conviene realizar unas pruebas de compatibilidad. **PROSIsal L** es compatible con la mayor parte de fertilizantes NPK y Fitosanitarios de uso normal. Evitar las mezclas con productos de reacción ácida como ácido fosfórico, sulfúrico, etc., así como mezclas con productos de reacción alcalina.

### Observaciones

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima, etc.) la compañía garantiza la composición, formulación y contenido.

El usuario es responsable de su aplicación. La empresa no se hace responsable de daños causados por mal uso del mismo (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.)



### CONTENIDO DECLARADO

Calcio (CaO)	12.5 %p/p (17.5 %p/v)
Densidad (gr/cc)	1.4
pH	6.5
Ácidos polihidroxicarboxílicos	Agente acomplejante

CULTIVOS	SUELO Lt/ha	APLICACIÓN
Cítricos y Frutales	20-40	Aplicar a partir de brotación hasta 1 mes antes de la pizca
Hortalizas (Tomate, Pimiento, Chiles)	25-60	Aplicar durante el ciclo del cultivo
Fresas	35-45	Aplicar durante el ciclo del cultivo
Otros Cultivos	35-45	Aplicar durante el ciclo del cultivo

Nota: Dosis recomendada, según el problema del suelo



México  
01 800 717 5865  
deptotec@prosisa.com

España:  
34 902 734 472  
comercialeur@prosisa.com

Jordania:  
00962 79 5998186  
yosef@prosisa.com

